

Carbex

(Carbocisteine)

100 mg / 5 ml

2% *Syrup*

Composition:

Each 5 ml contains:

Carbocisteine (Ph. Eur.) 100 mg

Product Complies Platinum Specs.

Carbex

(Carbocisteine)

250 mg / 5 ml

5% *Syrup*

Each 5 ml contains:

Carbocisteine (Ph. Eur.) 250 mg

Product Complies Platinum Specs.

Carbex Plus

(Carbocisteine +
Promethazine HCl)

Syrup

Each 5 ml contains:

Carbocisteine (Ph. Eur.) 100 mg +

Promethazine HCl (Ph. Eur.) 2.5 mg

Product Complies Platinum Specs.

PHARMACOLOGICAL PROPERTIES:

Pharmacodynamic properties:

Carbocisteine (S-Carboxymethyl L-cysteine) has been shown in normal and bronchitic animal models to affect the nature and amount of mucus glycoprotein which is secreted by the respiratory tract. An increase in the acid: neutral glycoprotein ratio of the mucus and a transformation of serous cells to mucus cells are known to be the initial response to irritation and will normally be followed by hypersecretion. The administration of Carbocisteine to animals exposed to irritants indicates that the glycoprotein that is secreted remain normal; administration after exposure indicates that return to the normal state is accelerated. Studies in humans have demonstrated that Carbocisteine reduces goblet cell hyperplasia. Carbocisteine can therefore be demonstrated to have a role in the management of disorders characterized by abnormal mucus.

Therapeutic indications:

Carbex 5% Syrup: Carbocisteine is a mucolytic agent for the adjunctive therapy of respiratory tract disorders characterized by excessive viscous mucus, including suppurative otitis media (glue ear) and chronic obstructive airways disease.

Carbex 2% Syrup: Carbocisteine is a mucolytic agent for the adjunctive therapy of respiratory tract disorders characterized by excessive or viscous mucus.

Carbex Plus Syrup: is indicated for the symptomatic treatment of irritating, unproductive cough, particularly when occurring predominantly at night.

Dosage and administration:

Adults including elderly:

Dosage is based upon an initial daily dosage of 2250 mg Carbocisteine in divided doses reducing to 1500 mg daily in divided doses when a satisfactory response obtained.

Carbex 5% Syrup: For adults and over age of 15 years: 15 ml (3 teaspoonful) 3 times in a day reducing to 10 ml (2 teaspoonful) 3 times in a day or as prescribed by the physician.

Carbex 2% Syrup:

Children aged 2 to 5 years: 5 ml (1 tea spoonful) two times in a day.

Children aged 5 to 15 years: 5 ml (1 tea spoonful) three times in a day or as prescribed by the physician.

Carbex Plus Syrup:

For Adults and children aged over 2 years only: For children comply with your doctor's prescription. Use 5 ml (1 teaspoon).

From 24 to 30 months: 3 to 4 teaspoons per day.

From 30 months to 12 years: 4 to 6 teaspoons per day.

From 12 years to 15 years: 6 to 9 teaspoons per day.

For Adults: 9 to 12 teaspoons / day in divided doses.

Contraindications:

Active peptic ulceration.

Special warnings and precautions for use: Not yet reported.

Interaction with other medicinal products and other forms of Interaction: Not yet reported.

Pregnancy and lactation: Although tests in mammalian species have revealed no teratogenic effects, Carbex is not recommended during the first trimester of pregnancy.

Use in lactation: Effects not known.

Effects on ability to drive and use machines: Not yet reported.

Undesirable effects: There have been rare reports of skin rashes or gastrointestinal bleeding occurring during treatment with Carbex.

Overdose:

Gastric lavage may be beneficial, followed by observation. Gastrointestinal disturbance is the most likely symptom of Carbex over dosage.

Store below 30°C, protect from light.

To be dispensed on the prescription of a registered medical practitioner only.

Close the cap tightly after use.

Keep out of the reach of children.

Presentation:

Carbex Syrup 100 mg / 5 ml (2%) : Pack of 1 x 120 ml in bottle.

Carbex Syrup 250 mg / 5 ml (5%) : Pack of 1 x 120 ml in bottle.

Carbex Plus Syrup: Pack of 1 x 120 ml in bottle.

Manufactured by:

 **Platinum**
Pharmaceuticals (Pvt.) Ltd.

A 20, North Western Industrial Zone,
Bin Qasim, Karachi-75020, Pakistan.

QAR No. AW15-0024

کاربیکس پلس

(کاربوسٹین +
پرومیٹھازین ہائیڈروکلورائیڈ)

سیرپ

کاربیکس

(کاربوسٹین)
۲۵۰ ملی گرام / ۵ ملی لیٹر

۵% سیرپ

کاربیکس

(کاربوسٹین)
۱۰۰ ملی گرام / ۵ ملی لیٹر

۲% سیرپ

علامات:

کاربوسٹین ایک میوکولائٹک دوا ہے جو کہ نظام تنفس سے تعلق رکھنے والی بیماریوں کے خلاف ایک موثر دوا کا کردار ادا کرتی ہے۔ جن میں زیادہ یا گاڑھا بلغم کا ہونا (بشمول گاڑھے بلغم کی وجہ سے کانوں کا متاثر ہونا) اور Obstructive Pulmonary Disease خشک اور گلے میں کھلبلی سے پیدا ہونے والی کھانسی سے آرام کے لئے، خصوصاً رات میں اٹھنے والی کھانسی کے لئے۔

خوراک اور طریقہ استعمال:

کاربیکس سیرپ ۲۵۰ ملی گرام / ۵ ملی لیٹر (۵%) بالغ افراد کے لئے
ابتدائی خوراک ۲۲۵۰ ملی گرام تقسیم شدہ خوراکیوں میں دوا کی مقدار علامات کم ہونے کے ساتھ ساتھ بتدریج ۱۵۰۰ ملی گرام تک کم کی جاسکتی ہے۔
کاربیکس ۵% سیرپ کی صورت میں ۱۵ ملی لیٹر (تین چائے کے چمچ) دن میں تین مرتبہ سے لے کر ۱۰ ملی لیٹر (دو چائے کے چمچ) دن میں تین مرتبہ۔

کاربیکس سیرپ ۱۰۰ ملی گرام / ۵ ملی لیٹر (۲%) (بچوں کیلئے) :

۲ سے ۵ سال تک کے بچوں کیلئے: ۵ ملی لیٹر (چائے کا ایک چمچ) دن میں دو مرتبہ
۵ سے ۱۵ سال تک کے بچوں کے لئے: ۵ ملی لیٹر (چائے کا ایک چمچ) دن میں تین مرتبہ یا ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق

کاربیکس پلس سیرپ: (بالغ افراد اور دو سال سے زائد عمر کے بچوں کیلئے)

بچوں کیلئے: ۵ ملی لیٹر (چائے کا چمچ) یا ڈاکٹر کے نسخے کے مطابق استعمال کریں۔

۳۰ تا ۳۳ ماہ کے بچوں کیلئے: ۳ تا ۴ چمچ دن میں۔

۳۰ تا ۱۲ سال کے بچوں کیلئے: ۳ تا ۴ چمچ دن میں۔

۱۲ تا ۱۵ سال کیلئے: ۶ تا ۹ چمچ دن میں۔

بالغ افراد کیلئے: ۹ تا ۱۲ چائے کے چمچ دن میں۔

☆ ۱۰۰ ملی گرام سے مراد ہے کہ ہر خوراک میں ۵ ملی لیٹر (چائے کا ایک چمچ)

ممنوعات:

معدے کی جلن اور تیزابیت

ناموافق اثرات: جلد پر ہونے والی الرجی، معدے کی جلن یا معدے سے خون کا بہنا۔

خوراک کی زیادتی: اس صورت میں معدہ کو خالی کرایا جانا فائدے مند ثابت ہو سکتا ہے مریض کی نگہداشت ضروری ہے۔

۳۰ ڈگری سینٹی گریڈ سے کم درجہ حرارت پر روشنی سے بچا کر رکھیں۔

صرف رجسٹرڈ ڈاکٹر کے نسخے پر فروخت کریں۔

استعمال کے بعد ڈھکن کو اچھی طرح بند کریں۔

بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں۔

پیشکش:

کاربیکس سیرپ ۱۰۰ ملی گرام / ۵ ملی لیٹر (۲٪) ۱۲۰ ملی لیٹر (گلاس بوتل میں)

کاربیکس سیرپ ۲۵۰ ملی گرام / ۵ ملی لیٹر (۵٪) ۱۲۰ ملی لیٹر (گلاس بوتل میں)

کاربیکس پلس سیرپ ۱۲۰ ملی لیٹر (گلاس بوتل میں)